

**Principaux Pesticides Homologués pour le traitement des locaux de stockage**

Nom commercial	Matière active	Dose
ACTELLIC 50 EC	Pyrimiphos-méthyl	1 CC/M2
BROMOKAL	Bromure de méthyle + Chlorpicrine + acétate d'amyl	18 à 100 g/m3
DECOFENATO POT	Orthophényl phénol	1 pot fumigène de 500g/500m3
K-OBIOL EC 25 PB	Deltaméthrine + Pipéronyl butoxide	60 cc/100 m2
K-OTHRINE 2,5 WP	Deltaméthrine	1 Kg/1000 L
		2 Kg/ 1000 L
METABROM 98	Bromure de méthyle	18 à 100 g/m3
PROSTORE 420 EC	Malathion + Bifenthrine	125 cc/100 m2
RELDAN 40 EC	Chlorpyriphos éthyl	125 cc/5L/100 m2

**Principaux insecticides Homologués pour traitement des denrées stockées**

Nom commercial	Matière active	Dose
ACTELLIC 50 EC	Pyrimiphos-méthyl	20 CC/T
CELPHOS	Phosphure d'aluminium	4-6 Comprimès/m3
FUMITOXIN Comprimès	Phosphure d'aluminium	4-6 Comprimès/m4
FUMITOXIN PILLULES	Phosphure d'aluminium	20 Pillules/ m3
		6 à 12 Pilules/m3
FUMITOXIN SMOKE	Phosphure d'aluminium	1 cartouche/1000m3
K- BIOL	Deltaméthrine	50 g/q
K- BIOL EC 25 PB	Deltaméthrine + Pipéronyl butoxide	2 cc/q
MALYPHOS GRAIN	Malathion	50 g/q
PHOSTEK	Phosphure d'aluminium	4 Comprimès/m3
		7,25 comprimès/m3
METABROM 98	Bromure de méthyle	18 à 100 g/m3
SIF MALATHION	Malathion	25 g/q
SPINTOR 0,125 D	Spinosad	75 g/q

**Conditions d'usage des denrées alimentaires**

<b>Conditions d'usage</b>
Traitement 6 semaines avant entreposage
durée d'exposition: 12 à 48 heures
Locaux vides: pourriture des fruits
Badigeonnage
En support acqueux
durée d'exposition: 12 à 48 heures
Avant stockage

<b>Conditions d'usage</b>
Au stockage , remanance : 6 mois
Au stockage ( semences ou alimentation)
Au stockage, pour sacs empilés sous bâches
au stockage au silo
45 g/250 m3
Au stockage, pour sacs empilés sous bâches
Au stockage en silo
Durés d'exposition: 12 à 48 heures
Traitement des semences en stock